

Prior to your surgery or procedure, please continue your usual medications with the following **IMPORTANT** exceptions.

Blood thinners	Coumadin (Warfarin)	Hold FIVE days prior to procedure
	Plavix (clopidigrel), Ticlid (ticlopidine), Effient (prasugrel)	Hold SEVEN days prior to procedure
	Xarelto (Rivaroxaban), Pradaxa (Dabigatran), Eliquis (Apixaban) or other direct oral anticoagulants	Hold THREE days prior to procedure
Diabetes	Metformin (Glucophage)	For COLONOSCOPY: Hold on prep day and colonoscopy morning For SURGERY: hold on day of procedure
	Glipizide (Glucotrol), Glimepiride	Hold on day of procedure
	Pioglitazone (Actos), Rosiglitazone (Avandia)	Hold on day of procedure
	Sitagliptin (Januvia), Saxagliptin (Onglyza), Alogliptin (Nesina, Vipidia), Linagliptin (Tradjenta), Vildagliptin (Galvus)	Hold on day of procedure
	Canagliflozin (Invokana), Dapagliflozin (Farxiga), Empagliflozin (Jardiance), Ertugliflozin (Steglatro)	Hold THREE days prior to day of procedure
	Exenatide (Byetta), Liraglutide (Victoza or Saxenda), Semaglutide Oral (Rybelsus), Semaglutide Injection (Ozempic; Wegovy), Dulaglutide (Trulicity), Lixisenatide (Adyline), Tirzepatide (Mounjaro; Zepbound)	For weekly dosing, hold 7 days prior to procedure. (If taken exclusively for diabetes, other diabetes medications may be needed while dose is held—please contact your PCP for guidance.) For daily dosing, hold on day of procedure.
	Long Acting Insulin (Lantus, Basaglar, Tresiba)	For COLONOSCOPY: 50% typical dose on prep day and if taken in morning take 50% typical dose on colonoscopy day For SURGERY: 50% of typical dose on day of procedure
	Intermediate Insulin (NPH, Novalin 70/30, Novalog 70/30)	For COLONOSCOPY: 80% of typical dose on prep day; take 50% of typical dose on colonoscopy morning if CBG over 200 For SURGERY: 50% of typical dose on day of procedure
Blood Pressure	ACE Inhibitors: Benazepril, Captopril, Enalapril, Fosinopril, Lisinopril, Moexipril, Quinapril, Ramipril ARBs: Azilsartan, Candesartan, Eprosartan, Irbesartan, Losartan, Olmesartan, Telmisartan, Valsartan	Hold on day of procedure
Other	Supplements, Herbals, Iron, Vitamins, Baby Aspirin, Omega-3s, NSAIDs like ibuprofen, Celebrex, Mobic, Naproxen	Hold SEVEN days prior to colonoscopy/surgery

Anti-coagulantes	Coumadin (Warfarin)	Suspender CINCO días antes del procedimiento
	Plavix (clopidigrel), Ticlid (ticlopidine), Effient (prasugrel)	Suspender SIETE días antes del procedimiento
	Xarelto (Rivaroxaban), Pradaxa (Dabigatran), Eliquis (Apixaban) or other direct oral anticoagulants	Suspender TRES días antes del procedimiento
Diabetes	Metformin (Glucophage)	Para colonoscopia: Suspender el día de preparación y el día colonoscopia por la mañana Para cirugía: Suspender el día antes del procedimiento
	Glipizide (Glucotrol), Glimepiride	Suspender el día del procedimiento
	Pioglitazone (Actos), Rosiglitazone (Avandia)	Suspender el día del procedimiento
	Sitagliptin (Januvia), Saxagliptin (Onglyza), Alogliptin (Nesina, Vipidia), Linagliptin (Tradjenta), Vildagliptin	Suspender el día del procedimiento
	Canaglifozin (Invokana), Dapaglifozin (Farxiga), Empaglifozin (Jardiance), Ertuglifozin (Steglatro)	Suspender TRES días antes del procedimiento
	Exenatide (Byetta), Liraglutide (Victoza or Saxenda), Semaglutide Oral (Rybelsus), Semaglutide Injection (Ozempic; Wegovy), Dulaglutide (Trulicity), Lixisenatide (Adlyxine), Tirzepatide (Mounjaro; Zepbound)	Para colonoscopia y cirugía: Para dosificación semanal, suspender 7 días antes de la colonoscopia. <i>(Si se toma exclusivamente para la diabetes, es posible que se necesiten otros medicamentos para la diabetes mientras se suspende la dosis; comuníquese con su doctor(a) para obtener orientación).</i> Para la dosificación diaria, espere el día del procedimiento.
	Long Acting Insulin (Lantus, Basaglar, Tresiba)	Para colonoscopia: 50 % de la dosis típica el día de preparación y, si se toma por la mañana, tome el 50 % de la dosis típica el día de la colonoscopia. Para cirugía: si se toma por la mañana, tome el 50 % de la dosis típica el día del procedimiento
	Intermediate Insulin (NPH, Novalin 70/30, Novalog 70/30)	Para colonoscopia: 80 % de la dosis típica el día de preparación y, si se toma por la mañana, tome el 50 % de la dosis típica el día de la colonoscopia si su CBG es más de 200. Para cirugía: si se toma por la mañana, tome el 50 % de la dosis típica el día del procedimiento
Short Acting Insulin (Aspart, Lispro, Regular, Humalin)	Para colonoscopia: Dosis fija: 50% de la dosis típica el día de preparación y suspender el día de la colonoscopia Dosificación correccional: tomar dosis típica Para cirugía: Suspender el día del procedimiento	
Presión arterial/ hipertensión	ACE Inhibitors: Benazepril, Captopril, Enalapril, Fosinopril, Lisinopril, Moexipril, Quinapril, Ramipril ARBs: Azilsartan, Candesartan, Eprosartan, Irbesartan, Losartan, Olmesartan, Telmisartan, Valsartan	Suspender el día del procedimiento
Otros	Suplementos, Hierbas, Hierro, Vitaminas, Aspirin 81 mg, Omega-3s, NSAIDs como Ibuprofen, Celebrex, Mobic, Naproxen	Suspender SIETE días antes de la procedimiento